


Ficha Técnica

Prevalencia de consumo de tabaco en población de 20 años y más edad por tipo de localidad y grupo de edad según sexo



Fórmula

$$Pv_{(e)} = \left(\frac{PA_{(e,l,i)}}{P_{(e,l,i)}} \right) \times 100$$

en donde;

$Pv_{(e)}$ – Prevalencia de consumo de tabaco en la población del grupo de edad (e) que habita en la localidad (l) del sexo (i);

$PA_{(e,l,i)}$ – Población del grupo de edad (e) que consume tabaco de la localidad (l) y del sexo (i);

$P_{(e,l,i)}$ – Población del grupo de edad (e) de la localidad (l) y del sexo (i);

i - Sexo de la población: hombres y mujeres;

e - Grupo de edad: 20-29 años, 30-59 años, 60 y más años

l - Tipo de localidad: rural (menores a 2 500 habitantes) y urbana (Más de 2 500 habitantes).



Fuente

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.



Nota

La prevalencia de consumo de tabaco se definió como el consumo actual (últimos 30 días).

Ficha Técnica



Precisiones de la fuente

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) se utiliza como referente nacional fundamental para monitorear y poder realizar una evaluación del sistema de salud. Es una encuesta que nos proporciona información para la población desde los 0-4 años (preescolares), 5-9 años (escolares), 10 a 19 años (adolescentes) y de 20 años y más (adultos), de manera separada y sin periodicidad fija.



Interpretación

En México, el consumo de tabaco es uno de los principales problemas de salud pública ya que es un factor de riesgo para varias causas de mortalidad. El reducir el consumo de tabaco contribuye de manera importante a la reducción en la incidencia de las enfermedades no transmisibles.