

Prevalencia de consumo de tabaco en población de 20 años y más edad por tipo de localidad y grupo de edad según sexo

Fórmula	$Pv_{(e)} = \frac{PT_{(e,l,i)}}{P_{(e,l,i)}} * 100$
Pv_(e)	Prevalencia de consumo de tabaco en la población del grupo de edad (e) que habita en la localidad (l) del sexo (i)
PT_(e,l,i)	Población del grupo de edad (e) que consume tabaco de la localidad (l) y del sexo (i)
P_(e,l,i)	Población del grupo de edad (e) de la localidad (l) y del sexo (i)
i	Sexo de la población: hombres y mujeres
e	Grupo de edad: <ul style="list-style-type: none"> • 20-29 años • 30-59 años • 60 y más años
l	Tipo de localidad: rural (menores a 2500 habitantes), urbana (de 2500 a 99999 habitantes) y metropolitanas (100000 y más habitantes).
Fuente	Encuestas de adicciones
Precisiones de la fuente	Proporcionan información con representatividad a nivel nacional que permite determinar la prevalencia del consumo de drogas en México así como las características sociodemográficas de la población consumidora de 12 a 65 años. La periodicidad de la información es no determinada. Hay dos levantamientos 2002 y 2008.
Interpretación	Se refiere al número de consumidores de tabaco de 20 años y más edad de cada tipo de localidad con respecto a la población en estudio de la misma edad y localidad. Se calcula para cada sexo y grupo de edad.