

## *Mortalidad materna*

Uno de los principales problemas de salud pública que afecta a las mujeres en edad reproductiva es la mortalidad materna, es decir, las enfermedades y muertes relacionadas con las complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio.<sup>1</sup>

En particular, la razón de mortalidad materna se considera un indicador que revela severas condiciones de desigualdad y desventaja social de las mujeres en el logro de sus derechos fundamentales y en el ejercicio de la maternidad deseada. Para reducir la incidencia de muertes maternas se requiere del mejoramiento en la cobertura y calidad de servicios de salud reproductiva.

Entre los aspectos que han incidido en el descenso de la mortalidad materna en nuestro país se encuentran, el acceso universal a servicios de planificación familiar, el incremento en el uso de métodos anticonceptivos y, por otro lado, una mayor atención profesional prenatal y durante el parto, así como el acceso a cuidados obstétricos de emergencia.

En septiembre de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plantean en el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades en la salud infantil, la salud materna y enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y otras.

En 2022, se estimó la RMM en 38.2 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.

Las entidades federativas que presentaron una RMM mayor a la nacional fueron: Tlaxcala (81.7), Durango (70.3), Nayarit (68.3) y Chihuahua (67.6). Las entidades con la menor RMM fueron Aguascalientes (7.6), Baja California Sur (19.0), Sinaloa (20.5) y Morelos (20.8).

El reporte de las 678 muertes maternas ocurridas en ese año muestra que:

- 9.9% eran menores de 20 años.
- 15.3% eran hablantes de lengua indígena.
- 10.3% fallecieron en el hogar.
- 54.7% no tenía seguridad social ni protección a la salud.
- 6.0% contaba con Seguro Popular o INSABI.
- 88.5% contó con asistencia médica.

---

<sup>1</sup> Periodo comprendido dentro de los 42 días posteriores al parto.

## *Mortalidad materna*

- 20.4% falleció por edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio.
- 17.0% debido a complicaciones del trabajo de parto y del parto.
- 8.4% tuvo complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio.
- 10.3% por aborto.

### **Referencias**

INEGI, Estadísticas de mortalidad general, Defunciones para calcular la razón de mortalidad materna, Disponible en <https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados>, consultado el 14 de mayo de 2024.

Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Disponible en <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>, consultado el 18 de octubre de 2016.

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), Catálogo Nacional de Indicadores, Disponible en <https://www.snieg.mx/cni/default.aspx>, consultado el 14 de mayo de 2024.

Actualizada en mayo de 2024